BestBuffer КМК

БУФЕРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ

Дойные коровы

Буферная смесь для дойных коров эффективно борется с ацидозом, активирует рубцовое пищеварение, способствует полноценному перевариванию клетчатки, восстанавливает пищеварительную систему, нормализует обмен веществ, защищает от болезней конечностей.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ НА 1 КГ

Вещество	Единица измерения	Состав
Натрий	%	10,0
Калий	%	0,1
Марганец	%	5,0
Кальций	%	18,0

Вещество	Наличие
Эфирные масла	+
Пробиотик	+
Ароматизатор	+

СОСТАВ

Моносахариды, соли, пробиотик, ароматизатор, подсластитель.

BestBuffer КМК

БУФЕРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ДОЙНЫХ КОРОВ

Дойные коровы

- Пробиотики стимулируют рост полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшают иммунитет и клеточный метаболизм, ингибируют нежелательную микрофлору, увеличивают перевариваемость клетчатки кормов, улучшают конверсию корма
- Эфирные масла проявляют антибактериальную активность, оказывают противовоспалительный эффект, стимулируют иммунную систему, улучшают потребление корма
- Увеличение среднесуточного удоя натурального молока на 1.8-2.2 л
- Сокращение сервис-периода на 14-18 дней
- Снижение индекса осеменения с 3 до 1.8 доз на 1 плодотворное осеменение

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наличие в рационе кислых, влажных кормов (при общей влажности кормосмеси выше 50%)
- Высокий уровень концентратов в рационе (более 40% в сухом веществе)
- Несбалансированность концентратов (большое количество крахмала и/или протеина, ферментируемых в рубце)
- Недостаток качественных грубых кормов и эффективной клетчатки в рационе
- Внешние признаки ацидоза у животных (заболевания конечностей, низкое содержание жира в молоке, высокий уровень расхода кормов на единицу продукции, проблемы воспроизводства стада)
- Ацидоз в острой форме, атония рубца
- Первые 2–4 дня после отела для изменения величины кислотно-щелочного баланса крови в положительную сторону
- Раздельная (не в составе кормосмеси) дача концентратов



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в рационах высокопродуктивных коров до 100-150 дня лактации, далее — в зависимости от продуктивности, качества основных кормов и доли зерновых в рационе. Также может применяться при интенсивном откорме скота. Норма выдачи 100-250 г на голову

ФАСОВКА, ФОРМА ВЫПУСКА

Мешки 25 кг, россыпь

СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев с даты изготовления